

Hudklinikken Banegårdspladsen

Patientvejledning - Excision

Formål:

Man foretager excision for at fjerne et uønsket element i huden eller underhuden. Ved excision menes at elementet skæres ud med en skalpel, hvorefter såret sys sammen.

Udførelse:

Efter afvask med spritserviet foretages injektion af lokalbedøvelse. Bedøvelsen indsprøjtes under og omkring det element, der skal fjernes med en meget tynd kanyler. Området vil være bedøvet næsten umiddelbart efter indsprøjtningen. Udover stiksmerten vil der være en sviende smerte under indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken.

Herefter foretages afvaskning 2 gange af operationsfeltet med en speciel desinficerende væske, hvorefter der afdækkes med et sterilt papirhulstykke.

Elementet udskæres med en skalpel under sterile forhold. Efter at lægen har sikret sig, at der ikke er blødning, sys såret sammen. Der sys eventuelt i to lag, hvor de dybeste sting sys med absorberbar tråd, som ikke siden skal fjernes, men opløser sig selv. I huden sys med sting, som fjernes efter 1-2 uger.

Såret dækkes til sidst med et plaster. Der gives ekstra plastre med.

Efter operationen

Der vil meget sjældent være smerter efterfølgende blot en let ømhed.

Hvis der skulle opstå hævelse, rødme eller udtalt ømhed omkring såret kontaktes lægen.

Ved badning skal såret være beskyttet af det vandtætte plaster, idet det ikke bør blive vådt så længe stingene ikke er fjernet. Hvis plasteret falder af, sættes nyt plaster på.

Såret bør ikke udsættes for stræk i de første uger efter operationen, idet det i så fald vil kunne springe op. Der bør derfor ikke dyrkes idræt i denne periode.

Risikoen for dette er især afhængig af sårets længde og lokalisation. Der er størst risiko for sår på ben og ryg.

Ar

Alle operationer i huden, selv fjernelse af små elementer, vil kunne medføre en vis ardannelse.

Man vil opnå det bedste kosmetiske resultat hvis arret beskyttes imod stærk sol den første sommer efter operationen

Nogle mennesker danner såkaldte keloider, d.v.s. at der dannes større ar end hos andre. Man må derfor nøje overveje vigtigheden af at foretage operationen hos disse personer.

Hudklinikken Banegårdspladsen

Patientvejledning - Excision

Formål:

Man foretager excision for at fjerne et uønsket element i huden eller underhuden. Ved excision menes at elementet skæres ud med en skalpel, hvorefter såret sys sammen.

Udførelse:

Efter afvask med spritserviet foretages injektion af lokalbedøvelse. Bedøvelsen indsprøjtes under og omkring det element, der skal fjernes med en meget tynd kanyler. Området vil være bedøvet næsten umiddelbart efter indsprøjtningen. Udover stiksmerten vil der være en sviende smerte under indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken.

Herefter foretages afvaskning 2 gange af operationsfeltet med en speciel desinficerende væske, hvorefter der afdækkes med et sterilt papirhulstykke.

Elementet udskæres med en skalpel under sterile forhold. Efter at lægen har sikret sig, at der ikke er blødning, sys såret sammen. Der sys eventuelt i to lag, hvor de dybeste sting sys med absorberbar tråd, som ikke siden skal fjernes, men opløser sig selv. I huden sys med sting, som fjernes efter 1-2 uger.

Såret dækkes til sidst med et plaster. Der gives ekstra plastre med.

Efter operationen

Der vil meget sjældent være smerter efterfølgende blot en let ømhed.

Hvis der skulle opstå hævelse, rødme eller udtalt ømhed omkring såret kontaktes lægen.

Ved badning skal såret være beskyttet af det vandtætte plaster, idet det ikke bør blive vådt så længe stingene ikke er fjernet. Hvis plasteret falder af, sættes nyt plaster på.

Såret bør ikke udsættes for stræk i de første uger efter operationen, idet det i så fald vil kunne springe op. Der bør derfor ikke dyrkes idræt i denne periode.

Risikoen for dette er især afhængig af sårets længde og lokalisation. Der er størst risiko for sår på ben og ryg.

Ar

Alle operationer i huden, selv fjernelse af små elementer, vil kunne medføre en vis ardannelse.

Man vil opnå det bedste kosmetiske resultat hvis arret beskyttes imod stærk sol den første sommer efter operationen

Nogle mennesker danner såkaldte keloider, d.v.s. at der dannes større ar end hos andre. Man må derfor nøje overveje vigtigheden af at foretage operationen hos disse personer.